

經濟部水利署
規劃設計階段工程生態背景資料表

工程主辦機關	苗栗縣政府城鄉發展科	提交日期	民國 114 年 07 月 25 日
工程名稱	苗栗縣金色中港河口水環境整體改善計畫-中港溪下游水岸廊道整合計畫		
設計單位	新綠主義股份有限公司	縣市/鄉鎮	苗栗縣/竹南鎮
生態檢核團隊	森鄰生態有限公司	工程座標(TWD97)	X：234203.639054 Y：2728864.918082

1. 生態保育原則：

(前年度計畫所提原則)

- [迴避]沿線既有棲地與原生種喬木盡量不擾動破壞與原地保留。
- [迴避]相對天然環境，應避免過度開發，適當導入植被維護手段，標定竹林或生物棲息熱點區。
- [減輕]透過生態友善設計，使休閒遊憩場域與生態棲地維護共存。
- [減輕]施工階段應該要特別注意施工時程之規劃，避免施工時程與關鍵物種或濱海物種繁殖期衝突。
- [補償]透過棲地營造擴大生態棲息範圍。
- [補償]安全無虞不影響蓄洪量的情況下，考量可能進駐物種適度增加微棲地營造規劃設計(生態系服務)。
- [補償]建議可透過工程施做移除外來入侵種植物，並實施覆層植栽規劃，補植在地原生種及蜜源植栽，優化濱溪帶原生種生態棲地，提高誘鳥、誘蝶機能，期使植被復育與植群空間演替能趨於友善環境發展。

(本年度計畫增提原則)

官義渡生態公園部分：

- ◇ [迴避]未來相關營造作業或特定高噪音工項，應迴避關注生物類群活動期，其中園區內部營造建議迴避紫斑蝶遷徙期(3-4月以及9-10月)，臨河口作業則建議迴避冬候鳥棲息期(10月下旬至年3月)。
- ◇ [縮小]官義渡公園河口濕地生態豐富，建議採最大面積保留灘地縮小擾動範圍。
- ◇ [減輕]官義渡公園既有喬、灌木建議保留或納入綠化配置考量，避免直接移除。
- ◇ [減輕]園區內排水系統重建建議採不封底、多孔隙且兩側平緩之之乾砌石溝渠或草土溝，
- ◇ [補償]新建園內排水建議引入鄰近渠道，可透過園區環流達礫間淨化，並維持原內渠道具一定之生態基流量。
- ◇ [補償]官義渡河口多有外來魚類棲息，建議辦理外來種移除作業。
- ◇ [補償]紅樹林若過度擴張恐令河口生態環境變為單一化棲地類型，建議規劃限制紅樹林分布範圍約占總灘地面積約40-60%，並定期移除外擴族群，以維持河口微棲地多樣性。
- ◇ [補償]官義渡公園內可隨園內步道及排水系統重建，連結周邊溝渠水系，一併考量以河口濕地生態為主軸規劃人工溼地、生態滯洪池及步(棧)道，達園內排水改善、蓄水再利用、多樣微棲地營造、串聯生態藍綠網、提升河口公園滯洪韌性及園區生態主題多樣化等。


長青之森部分：

- ◇ [迴避]長青之森周邊為大面積防風林，多有野生動物棲息利用，相關設計應迴避既有林區，並保留樹徑大於15公分之喬木及竹南濕地濱溪植被。
- ◇ [減輕]長青之森臨海為大面積外埔沙灘，多有沙蟹科棲息，相關施作建議維持既有灘地自然底質，若有步道或自行車道設置需求，應採高架棧道避免大面積水泥化。
- ◇ [減輕]長青之森一帶流浪犬隻甚多，若考慮將本區規劃為生態觀光、保育及環境教育場址，建議未來若進入施工階段應避免於該區飼養、投餵流浪動物，並與動物保護防疫所協作誘捕並安置流浪犬隻。
- ◇ [補償]長青之森周邊南側竹南濕地具多處連續池體，記錄多樣蜻蜓棲息，冬季可供候鳥停棲，池中雖有魚類及龜類棲息，但多為外來的孔雀花鱗、食蚊魚、口孵非鯽雜交魚及紅耳泥龜等，建議辦理外來種調查及移除並適時導入原生物種。


通則：

- ✧ [迴避]未來相關營造作業或特定高噪音工項，應迴避關注生物類群活動期，其中園區內部營造建議迴避紫斑蝶遷徙期(3-4月以及9-10月)，臨河口作業則建議迴避冬候鳥棲息期(10月下旬至年3月)。
- ✧ [補償]官義渡公園及長青之森濱海林區同為紫斑蝶(斯氏紫斑蝶等)遷徙中繼站，可營造為紫斑蝶生態環境教育場址，建議多種植其食草，包括武靴藤、盤龍木及高士佛澤蘭等藤本及草本植被，計畫範圍內既有喬木及灌木等可一併納入未來園區複層式植栽配置規劃，避免直接移除。

2. 工程範圍圖：




工程範圍圖



工程生態情報圖

3. 生態資料蒐集成果檢視更新：

蒐集涵蓋本計畫規劃設計範圍之臺灣生物多樣網絡資料庫(TBN)，整理陸域植物、陸域動物及水域動物資料如下。經圖資套疊，兩區均落於國土生態綠網西北二關注區域以及桃竹苗海岸濕地保育軸帶，並臨關注河川中港溪，建議以棲地營造、水陸域廊道維持或改善並提高自然韌性為優先考量，並規範未來施工階段時確實採友善環境之施作行為。



臺灣生物多樣性網絡資料搜尋範圍

◇ 陸域植物

類別	科名	中文名	學名	區係	紅皮書	優先區*
蕨類植物	木賊科	木賊	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.	原生	LC	—
	卷柏科	全緣卷柏	<i>Selaginella delicatula</i> (Desv.) Alston	原生	LC	—
	卷柏科	異葉卷柏	<i>Selaginella mollendorffii</i> Hieron.	原生	LC	—
	金星蕨科	小毛蕨	<i>Christella acuminata</i> (Houtt.) H. Lév.	原生	LC	—
	金星蕨科	野小毛蕨	<i>Christella dentata</i> (Forssk.) Brownsey & Jermy	原生	LC	—
	金星蕨科	密毛小毛蕨	<i>Christella parasitica</i> (L.) H. Lév. ex Y.H. Chang	原生	LC	—
	金星蕨科	短柄卵果蕨	<i>Phegopteris decursive-pinnata</i> (H.C.Hall) Fée	原生	LC	—
	海金沙科	海金沙	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	原生	LC	○
	烏毛蕨科	珠芽狗脊蕨	<i>Woodwardia prolifera</i> Hook. & Arn.	原生	LC	—
	陵齒蕨科	烏蕨	<i>Odontosoria chinensis</i> (L.) J. Sm.	原生	LC	—
	腎蕨科	腎蕨	<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) C. Presl	原生	LC	—
	碗蕨科	虎克氏鱗蓋蕨	<i>Microlepia hookeriana</i> (Wall. ex Hook.) C. Presl	原生	LC	—
	碗蕨科	邊緣鱗蓋蕨	<i>Microlepia marginata</i> (Panzer) C. Chr. var. <i>marginata</i>	原生	LC	—
	碗蕨科	熱帶鱗蓋蕨	<i>Microlepia speluncae</i> (L.) T. Moore	原生	LC	—
	碗蕨科	粗毛鱗蓋蕨	<i>Microlepia strigosa</i> (Thunb.) C. Presl	原生	LC	—
	裏白科	芒萁	<i>Dicranopteris linearis</i> (Burm. f.) Underw.	原生	LC	—
	鳳尾蕨科	弧脈鳳尾蕨	<i>Pteris biaurita</i> L.	原生	LC	—
	蹄蓋蕨科	假蹄蓋蕨	<i>Deparia petersenii</i> (Kunze) M. Kato	原生	LC	—
	鱗毛蕨科	愛德氏肋毛蕨	<i>Ctenitis eatonii</i> (Baker) Ching	原生	LC	—
	鱗毛蕨科	南海鱗毛蕨	<i>Dryopteris varia</i> (L.) Kuntze	原生	LC	—

裸 子 植 物	羅漢松科	大葉羅漢松	<i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) Sweet var. <i>macrophyllus</i>	原生	EN	○
	蘇鐵科	蘇鐵	<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	栽培	NA	○
雙 子 葉 植 物	菊科	臺灣蒲公英	<i>Taraxacum formosanum</i> Kitam.	特有	EN	—
	五加科	鵝掌藤	<i>Heptapleurum ellipticum</i> (Blume) Seem.	原生	VU	—
	薔薇科	臺灣薔薇	<i>Rosa taiwanensis</i> Nakai	特有	VU	○
	紅樹科	水筆仔	<i>Kandelia obovata</i> C.R. Sheue, H.Y. Liu & J. Yong	原生	NT	○
	桔梗科	桔梗	<i>Campanula dimorphantha</i> Schweinf.	原生	NT	○
	報春花科	蘭嶼紫金牛	<i>Ardisia elliptica</i> Thunb.	原生	NT	○
	榆科	紅雞油	<i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.	原生	NT	—
	八仙花科	華八仙	<i>Hydrangea chinensis</i> Maxim.	原生	LC	—
	十字花科	蔞菜	<i>Cardamine flexuosa</i> With.	原生	LC	—
	三白草科	臭腥草	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	原生	LC	—
	千屈菜科	九芎	<i>Lagerstroemia subcostata</i> Koehne	原生	LC	—
	大麻科	石朴	<i>Celtis formosana</i> Hayata	特有	LC	—
	大麻科	朴樹	<i>Celtis sinensis</i> Pers.	原生	LC	○
	大麻科	葎草	<i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr.	原生	LC	—
	大麻科	山黃麻	<i>Trema orientalis</i> (L.) Blume	原生	LC	—
	大戟科	血桐	<i>Macaranga tanarius</i> (L.) Müll. Arg.	原生	LC	○
	大戟科	野桐	<i>Mallotus japonicus</i> (Spreng.) Müll. Arg.	原生	LC	—
	大戟科	扛香藤	<i>Mallotus repandus</i> (Rottler) Müll. Arg.	原生	LC	○
	山欖科	大葉山欖	<i>Palaquium formosanum</i> Hayata	原生	LC	—
	山欖科	山欖	<i>Planchonella obovata</i> (R. Br.) Pierre	原生	LC	—
	五加科	裏白蔥木	<i>Aralia bipinnata</i> Blanco	原生	LC	—
	五加科	三葉五加	<i>Eleutherococcus trifoliatus</i> (L.) S.Y. Hu var. <i>trifoliatus</i>	原生	LC	—
	五加科	通脫木	<i>Tetrapanax papyriferus</i> (Hook.) K. Koch	原生	LC	—
	五列木科	米碎衿木	<i>Eurya chinensis</i> R. Br.	原生	LC	—
	五福花科	有骨消	<i>Sambucus chinensis</i> Lindl.	原生	LC	—
	毛茛科	串鼻龍	<i>Clematis grata</i> Wall.	原生	LC	—
	毛茛科	鏽毛鐵線蓮	<i>Clematis leschenaultiana</i> DC.	原生	LC	—
	毛茛科	麥氏鐵線蓮	<i>Clematis meyeniana</i> Walp.	原生	LC	—
	母草科	倒地蜈蚣	<i>Torenia concolor</i> Lindl.	原生	LC	—
	石竹科	喜泉卷耳	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	原生	LC	—
	石竹科	蠅子草	<i>Silene fortunei</i> Vis. var. <i>fortunei</i>	原生	LC	—
	石竹科	鵝兒腸	<i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop.	原生	LC	—
	夾竹桃科	海欖果	<i>Cerbera manghas</i> L.	原生	LC	—

夾竹桃科	武靴藤	<i>Gymnema sylvestre</i> (Retz.) Schultes	原生	LC	—
夾竹桃科	臺灣牛彌菜	<i>Marsdenia formosana</i> Masam.	原生	LC	—
夾竹桃科	絡石	<i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lem.	原生	LC	—
忍冬科	忍冬	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	原生	LC	—
忍冬科	臺灣敗醬	<i>Patrinia formosana</i> Kitam.	特有	LC	—
豆科	相思樹	<i>Acacia confusa</i> Merr.	原生	LC	○
豆科	煉莢豆	<i>Alysicarpus vaginalis</i> (L.) DC. var. <i>vaginalis</i>	原生	LC	○
豆科	長萼野百合	<i>Crotalaria calycina</i> Schrank.	原生	LC	—
豆科	野百合	<i>Crotalaria sessiliflora</i> L.	原生	LC	—
豆科	刺桐	<i>Erythrina variegata</i> L.	原生	LC	○
豆科	水黃皮	<i>Millettia pinnata</i> (L.) Panigrahi	原生	LC	○
豆科	山葛	<i>Pueraria montana</i> (Lour.) Merr.	原生	LC	○
豆科	老荊藤	<i>Wisteriopsis reticulata</i> (Benth.) J. Compton & Schrire	原生	LC	—
車前科	車前草	<i>Plantago asiatica</i> L.	原生	LC	—
防己科	木防己	<i>Cocculus orbiculatus</i> (L.) DC.	原生	LC	—
防己科	千金藤	<i>Stephania japonica</i> (Thunb.) Miers var. <i>japonica</i>	原生	LC	○
使君子科	攬仁	<i>Terminalia catappa</i> L.	原生	LC	○
芸香科	月橘	<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack. var. <i>paniculata</i>	原生	LC	—
芸香科	食茱萸	<i>Zanthoxylum ailanthoides</i> Siebold & Zucc. var. <i>ailanthoides</i>	原生	LC	—
芸香科	雙面刺	<i>Zanthoxylum nitidum</i> (Roxb.) DC.	原生	LC	—
金絲桃科	地耳草	<i>Hypericum japonicum</i> Thunb.	原生	LC	—
柳葉菜科	細葉水丁香	<i>Ludwigia hyssopifolia</i> (G. Don) Exell	原生	LC	—
柳葉菜科	水丁香	<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) P.H. Raven	原生	LC	—
省沽油科	山香圓	<i>Turpinia formosana</i> Nakai	特有	LC	—
胡椒科	風藤	<i>Piper kadsura</i> (Choisy) Ohwi	原生	LC	—
茄科	雙花龍葵	<i>Lycianthes biflora</i> (Lour.) Bitter	原生	LC	—
茄科	龍葵	<i>Solanum nigrum</i> L.	原生	LC	○
茄科	印度茄	<i>Solanum violaceum</i> Ortega	原生	LC	—
唇形科	苦林盤	<i>Clerodendrum inerme</i> (L.) Gaertn.	原生	LC	○
唇形科	風輪菜	<i>Clinopodium chinense</i> (Benth.) Kuntze	原生	LC	○
唇形科	臭娘子	<i>Premna serratifolia</i> L.	原生	LC	—
唇形科	黃荊	<i>Vitex negundo</i> L.	原生	LC	—
唇形科	海埔姜	<i>Vitex rotundifolia</i> L. f.	原生	LC	○
桃金娘科	小葉赤楠	<i>Syzygium buxifolium</i> Hook. & Arn.	原生	LC	○
桑科	構樹	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L'Hér. ex Vent.	原生	LC	○
桑科	白榕	<i>Ficus benamina</i> L.	原生	LC	—
桑科	牛奶榕	<i>Ficus erecta</i> Thunb. var. <i>beeheyana</i> (Hook. & Arn.) King	原生	LC	—

桑科	天仙果	<i>Ficus formosana</i> Maxim.	原生	LC	—
桑科	榕樹	<i>Ficus microcarpa</i> L. f. var. <i>microcarpa</i>	原生	LC	○
桑科	薜荔	<i>Ficus pumila</i> L. var. <i>pumila</i>	原生	LC	○
桑科	阿里山珍珠蓮	<i>Ficus sarmentosa</i> Buch.-Ham. ex Sm. var. <i>henryi</i> (King ex Oliv.) Corner	原生	LC	—
桑科	白肉榕	<i>Ficus virgata</i> Reinw. ex Blume	原生	LC	○
桑科	小葉桑	<i>Morus alba</i> L. var. <i>indica</i> (L.) Bureau	原生	LC	○
桔梗科	臺灣土黨參	<i>Cyclocodon lancifolius</i> (Roxb.) Kurz	原生	LC	—
海桐科	大葉海桐	<i>Pittosporum daphniphyllodes</i> Hayata	特有	LC	—
海桐科	海桐	<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T. Aiton	原生	LC	—
茜草科	豬殃殃	<i>Galium spurium</i> L.	原生	LC	—
茜草科	山黃梔	<i>Gardenia jasminoides</i> J. Ellis	原生	LC	—
茜草科	繖花龍吐珠	<i>Hedyotis corymbosa</i> (L.) Lam.	原生	LC	—
茜草科	毛玉葉金花	<i>Mussaenda pubescens</i> W.T. Aiton	原生	LC	—
茜草科	毛雞屎藤	<i>Paederia cavaleriei</i> H. Lévl.	原生	LC	—
茜草科	雞屎藤	<i>Paederia foetida</i> L.	原生	LC	○
茜草科	水金京	<i>Wendlandia formosana</i> Cowan	原生	LC	—
茶科	細葉山茶	<i>Camellia tenuifolia</i> (Hayata) Coh-Stuart	特有	LC	—
草海桐科	草海桐	<i>Scaevola taccada</i> (Gaertn.) Roxb.	原生	LC	—
馬齒莧科	馬齒莧	<i>Portulaca oleracea</i> L.	原生	LC	—
馬鞭草科	鴨舌癩	<i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene	原生	LC	○
旋花科	馬蹄金	<i>Dichondra micrantha</i> Urb.	原生	LC	○
旋花科	野牽牛	<i>Ipomoea obscura</i> (L.) Ker Gawl.	原生	LC	○
旋花科	馬鞍藤	<i>Ipomoea pes-caprae</i> (L.) R. Br. subsp. <i>brasiliensis</i> (L.) Oostst.	原生	LC	—
旋花科	盒果藤	<i>Operculina turpethum</i> (L.) S. Manso	原生	LC	○
莧科	變葉藜	<i>Chenopodium acuminatum</i> Willd. subsp. <i>virgatum</i> (Thunb.) Kitam.	原生	LC	—
莧科	藜	<i>Chenopodium album</i> L.	原生	LC	—
莧科	裸花鹹蓬	<i>Suaeda maritima</i> (L.) Dum.	原生	LC	—
通泉草科	通泉草	<i>Mazus pumilus</i> (Burm. f.) Steenis	原生	LC	○
報春花科	樹杞	<i>Ardisia sieboldii</i> Miq.	原生	LC	—
報春花科	黑星紫金牛	<i>Ardisia virens</i> Kurz	原生	LC	—
報春花科	小茄	<i>Lysimachia japonica</i> Thunb.	原生	LC	—
無患子科	樟葉槭	<i>Acer albopurpurascens</i> Hayata	特有	LC	—
無患子科	車桑子	<i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq.	原生	LC	—
番杏科	海馬齒	<i>Sesuvium portulacastrum</i> (L.) L.	原生	LC	○
番杏科	番杏	<i>Tetragonia tetragonoides</i> (Pall.) Kuntze	原生	LC	—
番荔枝科	瓜馥木	<i>Fissistigma oldhamii</i> (Hemsl.) Merr.	原生	LC	—

紫草科	小花倒提壺	<i>Cynoglossum lanceolatum</i> Forssk.	原生	LC	—
菊科	茵陳蒿	<i>Artemisia capillaris</i> Thunb.	原生	LC	—
菊科	艾	<i>Artemisia indica</i> Willd.	原生	LC	—
菊科	生毛將軍	<i>Blumea lacera</i> (Burm. f.) DC.	原生	LC	—
菊科	大頭艾納香	<i>Blumea riparia</i> (Blume) DC. var. <i>megacephala</i> Randeria	原生	LC	—
菊科	鱧腸	<i>Eclipta prostrata</i> (L.) L.	原生	LC	○
菊科	紫背草	<i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC. var. <i>javanica</i> (Burm. f.) Mattf.	原生	LC	○
菊科	臺灣澤蘭	<i>Eupatorium formosanum</i> Hayata	特有	LC	—
菊科	鼠麴草	<i>Gnaphalium luteoalbum</i> L. subsp. <i>affine</i> (D. Don) Koster	原生	LC	—
菊科	刀傷草	<i>Ixeridium laevigatum</i> (Blume) Pak & Kawano	原生	LC	○
菊科	兔仔菜	<i>Ixeris chinensis</i> (Thunb.) Nakai	原生	LC	○
菊科	蔓澤蘭	<i>Mikania cordata</i> (Burm. f.) B.L. Rob.	原生	LC	—
菊科	鵝仔草	<i>Pterocypsela indica</i> (L.) C. Shih	原生	LC	○
菊科	一枝香	<i>Vernonia cinerea</i> (L.) Less. var. <i>cinerea</i>	原生	LC	○
菊科	黃鵪菜	<i>Youngia japonica</i> (L.) DC. subsp. <i>japonica</i>	原生	LC	○
酢漿草科	酢漿草	<i>Oxalis corniculata</i> L.	原生	LC	○
黃耆花科	猿尾藤	<i>Hiptage benghalensis</i> (L.) Kurz.	原生	LC	—
楊柳科	水柳	<i>Salix warburgii</i> Seemen	特有	LC	○
楊柳科	魯花樹	<i>Scolopia oldhamii</i> Hance	原生	LC	—
楝科	楝	<i>Melia azedarach</i> L.	原生	LC	○
榆科	檉	<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	原生	LC	—
葉下珠科	茄苳	<i>Bischofia javanica</i> Blume	原生	LC	—
葉下珠科	紅仔珠	<i>Breynia officinalis</i> Hemsl. var. <i>officinalis</i>	原生	LC	○
葉下珠科	刺杜密	<i>Bridelia balansae</i> Tutcher	原生	LC	—
葉下珠科	土密樹	<i>Bridelia tomentosa</i> Blume	原生	LC	—
葉下珠科	細葉饅頭果	<i>Glochidion rubrum</i> Blume	原生	LC	—
葡萄科	地錦	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Siebold & Zucc.) Planch.	原生	LC	—
葡萄科	三葉崖爬藤	<i>Tetrastigma formosanum</i> (Hemsl.) Gagnep.	特有	LC	○
葡萄科	臺灣崖爬藤	<i>Tetrastigma umbellatum</i> (Hemsl.) Nakai	特有	LC	—
葫蘆科	木鼈子	<i>Momordica cochinchinensis</i> (Lour.) Spreng.	原生	LC	○
葫蘆科	天花	<i>Mukia maderaspatana</i> (L.) M. Roem.	原生	LC	—
葫蘆科	斑花青牛膽	<i>Thladiantha punctata</i> Hayata	原生	LC	—
葫蘆科	王瓜	<i>Trichosanthes cucumeroides</i> (Ser.) Maxim.	原生	LC	—
鼠刺科	小花鼠刺	<i>Itea parviflora</i> Hemsl.	特有	LC	—
漆樹科	黃連木	<i>Pistacia chinensis</i> Bunge	原生	LC	—
蒺藜科	蒺藜	<i>Tribulus terrestris</i> L.	原生	LC	○
樟科	樟樹	<i>Camphora officinarum</i> Nees	原生	LC	—

樟科	山胡椒	<i>Litsea cubeba</i> (Lour.) Pers.	原生	LC	—
樟科	黃肉樹	<i>Litsea hypophaea</i> Hayata	特有	LC	—
樟科	假長葉楠	<i>Machilus japonica</i> Siebold & Zucc. var. <i>japonica</i>	原生	LC	—
樟科	香楠	<i>Machilus zuihoensis</i> Hayata var. <i>zuihoensis</i>	特有	LC	—
蓼科	臺灣何首烏	<i>Fallopia multiflora</i> (Thunb.) Haraldson	特有	LC	—
蕁麻科	長葉苧麻	<i>Boehmeria wattersii</i> (Hance) B.L. Shih & Y.P. Yang	特有	LC	—
蕁麻科	水麻	<i>Debregeasia orientalis</i> C.J. Chen	原生	LC	—
蕁麻科	冷清草	<i>Elatostema lineolatum</i> Wight var. <i>majus</i> Wedd.	原生	LC	—
蕁麻科	赤車使者	<i>Pellionia radicans</i> (Siebold & Zucc.) Wedd.	原生	LC	—
蕁樹科	楓香	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	原生	LC	—
錦葵科	山芙蓉	<i>Hibiscus taiwanensis</i> S.Y. Hu	特有	LC	—
錦葵科	黃槿	<i>Hibiscus tiliaceus</i> L.	原生	LC	○
錦葵科	細葉金午時花	<i>Sida acuta</i> Burm. f.	原生	LC	—
錦葵科	圓葉金午時花	<i>Sida cordifolia</i> L.	原生	LC	—
錦葵科	金午時花	<i>Sida rhombifolia</i> L. subsp. <i>rhombifolia</i>	原生	LC	○
錦葵科	野棉花	<i>Urena lobata</i> L.	原生	LC	—
錦葵科	梵天花	<i>Urena procumbens</i> L.	原生	LC	—
爵床科	海茄苳	<i>Avicennia marina</i> (Forsk.) Vierh.	原生	LC	○
爵床科	華九頭獅子草	<i>Dicliptera chinensis</i> (L.) Juss.	原生	LC	—
爵床科	爵床	<i>Rostellularia procumbens</i> (L.) Nees var. <i>procumbens</i>	原生	LC	—
薔薇科	山櫻花	<i>Prunus campanulata</i> Maxim.	原生	LC	—
薔薇科	紅梅消	<i>Rubus parvifolius</i> L. var. <i>parvifolius</i>	原生	LC	—
繖形科	雷公根	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	原生	LC	○
繖形科	鴨兒芹	<i>Cryptotaenia japonica</i> Hassk.	原生	LC	—
藍雪科	石菰蓉	<i>Limonium sinense</i> (Girard) Kuntze	原生	LC	○
藤黃科	恆春福木	<i>Garcinia multiflora</i> Champ.	原生	LC	○
獼猴桃科	水冬瓜	<i>Saurauia tristyla</i> DC. var. <i>oldhamii</i> (Hemsl.) Finet & Gagnep.	原生	LC	—
罌粟科	臺灣黃堇	<i>Corydalis tashiroi</i> Makino	原生	LC	—
胡頹子科	楸梧	<i>Elaeagnus oldhamii</i> Maxim	原生	DD	○
旋花科	菟絲子	<i>Cuscuta australis</i> R. Br.	原生	DD	—
莧科	臺灣濱藜	<i>Atriplex nummularia</i> Lindl.	原生	DD	—
報春花科	鯽魚膽	<i>Maesa perlaria</i> (Lour.) Merr. var. <i>perlaria</i>	原生	DD	○
十字花科	薺	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	原生	NA	○
十字花科	獨行菜	<i>Lepidium virginicum</i> L.	歸化	NA	○
千屈菜科	長葉水莧菜	<i>Ammannia × coccinea</i> Rathb.	歸化	NA	○
千屈菜科	耳葉水莧菜	<i>Ammannia auriculata</i> Willd.	歸化	NA	—
千屈菜科	細葉雪茄花	<i>Cuphea hyssopifolia</i> Kunth	栽培	NA	—

大戟科	威氏鐵莧	<i>Acalypha wilkesiana</i> Müll. Arg.	栽培	NA	○
大戟科	猩猩草	<i>Euphorbia cyathophora</i> Murray	歸化	NA	○
大戟科	大飛揚草	<i>Euphorbia hirta</i> L.	原生	NA	—
大戟科	匍根大戟	<i>Euphorbia serpens</i> Kunth	歸化	NA	○
大戟科	樹薯	<i>Manihot esculenta</i> Crantz.	歸化	NA	○
大戟科	紅雀珊瑚	<i>Pedilanthus tithymaloides</i> (L.) Poit.	栽培	NA	—
大戟科	蓖麻	<i>Ricinus communis</i> L.	歸化	NA	—
大戟科	烏柏	<i>Triadica sebifera</i> (L.) Small	原生	NA	○
木麻黃科	木麻黃	<i>Casuarina equisetifolia</i> L.	歸化	NA	○
仙人掌科	單刺仙人掌	<i>Opuntia monacantha</i> Haw.	栽培	NA	○
石竹科	無心菜	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	歸化	NA	—
西番蓮科	百香果	<i>Passiflora edulis</i> Sims.	歸化	NA	—
西番蓮科	三角葉西番蓮	<i>Passiflora suberosa</i> L. subsp. <i>litoralis</i> (Kunth) Port.-Utl. ex Milward de Azevedo, Baumgratz & Gonç.-Estev.	歸化	NA	—
夾竹桃科	長春花	<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don	歸化	NA	○
夾竹桃科	夾竹桃	<i>Nerium oleander</i> L.	栽培	NA	○
豆科	洋紫荊	<i>Bauhinia purpurea</i> L.	歸化	NA	—
豆科	蝶豆	<i>Clitoria ternatea</i> L.	栽培	NA	○
豆科	南美豬屎豆	<i>Crotalaria trichotoma</i> Bojer	歸化	NA	—
豆科	銀合歡	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	入侵	NA	○
豆科	黃花羽扇豆	<i>Lupinus luteus</i> L.	栽培	NA	○
豆科	賽蜀豆	<i>Macroptilium atropurpureum</i> (DC.) Urb.	歸化	NA	—
豆科	天藍苜蓿	<i>Medicago lupulina</i> L.	歸化	NA	○
豆科	印度草木樨	<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.	歸化	NA	—
豆科	含羞草	<i>Mimosa pudica</i> L.	歸化	NA	—
豆科	田菁	<i>Sesbania cannabiana</i> (Retz.) Poir	歸化	NA	—
豆科	小巢豆	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	歸化	NA	○
車前科	毛車前草	<i>Plantago virginica</i> L.	歸化	NA	—
使君子科	小葉欖仁	<i>Terminalia boivinii</i> Tul.	栽培	NA	○
柳葉菜科	裂葉月見草	<i>Oenothera laciniata</i> Hill	歸化	NA	○
柳葉菜科	待宵草	<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	歸化	NA	—
茄科	番茄	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. var. <i>esculentum</i>	栽培	NA	○
茄科	皺葉煙草	<i>Nicotiana plumbaginifolia</i> Viv.	歸化	NA	—
茄科	光果龍葵	<i>Solanum americanum</i> Mill.	入侵	NA	—
茄科	瑪瑙珠	<i>Solanum diphyllum</i> L.	歸化	NA	○
茄科	萬桃花	<i>Solanum torvum</i> Swartz	歸化	NA	—
唇形科	頭花香苦草	<i>Hyptis rhomboidea</i> M. Martens & Galeotti	歸化	NA	—

桃金娘科	桉	<i>Eucalyptus robusta</i> Sm.	栽培	NA	—
茜草科	巴西擬鴨舌癩	<i>Richardia brasiliensis</i> Gomes	歸化	NA	—
茜草科	擬鴨舌癩	<i>Richardia scabra</i> L.	歸化	NA	—
茜草科	闊葉鴨舌癩舅	<i>Spermacoce latifolia</i> Aubl.	歸化	NA	○
馬鞭草科	馬纓丹	<i>Lantana × strigocamara</i> R.W. Sanders	歸化	NA	○
旋花科	平原莧絲子	<i>Cuscuta campestris</i> Yunk.	歸化	NA	○
旋花科	甕菜	<i>Ipomoea aquatica</i> Forsk.	入侵	NA	—
旋花科	甘薯	<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.	歸化	NA	—
旋花科	番仔藤	<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet	歸化	NA	—
旋花科	銳葉牽牛	<i>Ipomoea indica</i> (Burm. f.) Merr.	歸化	NA	○
旋花科	紅花野牽牛	<i>Ipomoea triloba</i> L.	歸化	NA	—
莧科	空心蓮子草	<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart) Griseb.	歸化	NA	○
莧科	蓮子草	<i>Alternanthera sessilis</i> (L.) R. Br. ex DC.	歸化	NA	○
莧科	凹葉野莧菜	<i>Amaranthus lividus</i> L.	歸化	NA	—
莧科	青莧	<i>Amaranthus patulus</i> Bertol.	歸化	NA	—
莧科	刺莧	<i>Amaranthus spinosus</i> L.	歸化	NA	—
莧科	野莧菜	<i>Amaranthus viridis</i> L.	歸化	NA	—
莧科	臭杏	<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants	歸化	NA	—
莧科	假千日紅	<i>Gomphrena celosioides</i> Mart.	歸化	NA	—
無患子科	倒地鈴	<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	歸化	NA	—
無患子科	龍眼	<i>Euphoria longana</i> Lam.	歸化	NA	—
紫茉莉科	紅花黃細心	<i>Boerhavia coccinea</i> Mill.	歸化	NA	—
紫茉莉科	九重葛	<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	栽培	NA	—
紫茉莉科	紫茉莉	<i>Mirabilis jalapa</i> L.	歸化	NA	○
紫葳科	火焰木	<i>Spathodea campanulata</i> P. Beauv.	歸化	NA	—
菊科	藿香薊	<i>Ageratum conyzoides</i> L.	歸化	NA	—
菊科	紫花藿香薊	<i>Ageratum houstonianum</i> Mill.	入侵	NA	—
菊科	掃帚菊	<i>Aster subulatus</i> Michx. var. <i>subulatus</i>	歸化	NA	○
菊科	白花鬼針	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>pilosa</i>	歸化	NA	○
菊科	美洲假蓬	<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronq.	歸化	NA	○
菊科	加拿大蓬	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronq. var. <i>canadensis</i>	歸化	NA	—
菊科	野茼蒿	<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E. Walker	入侵	NA	○
菊科	波斯菊	<i>Coreopsis tinctoria</i> Nutt.	歸化	NA	—
菊科	昭和草	<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S. Moore	歸化	NA	—
菊科	地膽草	<i>Elephantopus mollis</i> Kunth	歸化	NA	○
菊科	天人菊	<i>Gaillardia pulchella</i> Foug.	歸化	NA	—
菊科	小米菊	<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	歸化	NA	—

	菊科	粗毛小米菊	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav.	歸化	NA	—
	菊科	直莖鼠麴草	<i>Gnaphalium calviceps</i> Fernald	歸化	NA	—
	菊科	鼠麴舅	<i>Gnaphalium purpureum</i> L.	歸化	NA	—
	菊科	瓜葉向日葵	<i>Helianthus debilis</i> Nuttall subsp. <i>cucumerifolius</i> (Torrey & A. Gray) Heiser	歸化	NA	—
	菊科	小花蔓澤蘭	<i>Mikania micrantha</i> Kunth	入侵	NA	—
	菊科	銀膠菊	<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	歸化	NA	○
	菊科	翼莖闊苞菊	<i>Pluchea sagittalis</i> (Lam.) Cabera	歸化	NA	—
	菊科	貓腥草	<i>Praxelis clematidea</i> R.M. King & H. Rob.	歸化	NA	—
	菊科	假吐金菊	<i>Soliva anthemifolia</i> (Juss.) R. Br.	歸化	NA	—
	菊科	苦苣菜	<i>Sonchus arvensis</i> L.	歸化	NA	—
	菊科	苦蕒菜	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	歸化	NA	—
	菊科	金腰箭	<i>Synedrella nodiflora</i> (L.) Gaertn.	歸化	NA	—
	菊科	西洋蒲公英	<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	歸化	NA	—
	菊科	長柄菊	<i>Tridax procumbens</i> L.	歸化	NA	○
	酢漿草科	紫花酢漿草	<i>Oxalis corymbosa</i> DC.	歸化	NA	○
	落葵科	落葵	<i>Basella alba</i> L.	歸化	NA	○
	葫蘆科	垂果瓜	<i>Melothria pendula</i> L.	歸化	NA	○
	葫蘆科	苦瓜	<i>Momordica charantia</i> L. var. <i>charantia</i>	歸化	NA	—
	漆樹科	巴西胡椒木	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	歸化	NA	○
	樟科	陰香	<i>Cinnamomum burmannii</i> (Nees) Blume	歸化	NA	○
	樟科	酪梨	<i>Persea americana</i> Mill.	栽培	NA	○
	蓼科	扛板歸	<i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H. Gross	歸化	NA	—
	蓼科	皺葉酸模	<i>Rumex crispus</i> L. var. <i>crispus</i>	歸化	NA	○
	蕁麻科	苧麻	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich. var. <i>nivea</i>	歸化	NA	○
	錦葵科	大葉苘麻	<i>Abutilon grandifolium</i> (Willd.) Sweet	歸化	NA	—
	錦葵科	朱槿	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	栽培	NA	—
	錦葵科	賽葵	<i>Malvastrum coromandelianum</i> (L.) Garcke	歸化	NA	○
	爵床科	赤道櫻草	<i>Asystasia gangetica</i> (L.) T. Anderson	歸化	NA	○
	薔薇科	梅	<i>Prunus mume</i> (Siebold) Siebold & Zucc.	歸化	NA	—
	芭蕉科	阿寬蕉	<i>Musa itinerans</i> Cheesman	原生	CR	○
單 子 葉 植 物	鴨跖草科	矮水竹葉	<i>Murdannia spirata</i> (L.) Brückn.	原生	VU	—
	水龍科	水車前草	<i>Ottelia alismoides</i> (L.) Pers.	原生	NT	—
	禾本科	臺灣虎尾草	<i>Chloris formosana</i> (Honda) Keng	原生	NT	—
	禾本科	裂稈草	<i>Schizachyrium brevifolium</i> (Sw.) Nees ex Buse	原生	NT	○
	天南星科	蘭嶼姑婆芋	<i>Alocasia macrorrhiza</i> (L.) G. Don	原生	LC	—
物	天南星科	拎樹藤	<i>Epipremnum pinnatum</i> (L.) Engl. ex Engl. & Kraus	原生	LC	—

禾本科	蘆竹	<i>Arundo donax</i> L.	原生	LC	-
禾本科	臺灣蘆竹	<i>Arundo formosana</i> Hack.	原生	LC	○
禾本科	四生臂形草	<i>Brachiaria subquadripara</i> (Trin.) Hitchc.	原生	LC	-
禾本科	竹節草	<i>Chrysopogon aciculatus</i> (Retz.) Trin.	原生	LC	○
禾本科	扭鞘香茅	<i>Cymbopogon tortilis</i> (J. Presl) A. Camus	原生	LC	-
禾本科	狗牙根	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	原生	LC	-
禾本科	弓果黍	<i>Cyrtococcum patens</i> (L.) A. Camus	原生	LC	○
禾本科	龍爪茅	<i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) Willd.	原生	LC	-
禾本科	升馬唐	<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koeler	原生	LC	○
禾本科	亨利馬唐	<i>Digitaria henryi</i> Rendle	原生	LC	○
禾本科	叢立馬唐	<i>Digitaria leptalea</i> Ohwi var. <i>reticulmis</i> Ohwi	原生	LC	-
禾本科	長花馬唐	<i>Digitaria longiflora</i> (Retz.) Pers.	原生	LC	-
禾本科	小馬唐	<i>Digitaria radicata</i> (J. Presl) Miq. var. <i>radicata</i>	原生	LC	-
禾本科	短穎馬唐	<i>Digitaria setigera</i> Roth	原生	LC	○
禾本科	紫果馬唐	<i>Digitaria violascens</i> Link	原生	LC	○
禾本科	芒稷	<i>Echinochloa colona</i> (L.) Link	原生	LC	○
禾本科	稗	<i>Echinochloa crusgalli</i> (L.) P. Beauv.	原生	LC	-
禾本科	牛筋草	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	原生	LC	○
禾本科	肯氏畫眉草	<i>Eragrostis cumingii</i> Steud.	原生	LC	○
禾本科	畫眉草	<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P. Beauv.	原生	LC	-
禾本科	鯽魚草	<i>Eragrostis tenella</i> (L.) P. Beauv.	原生	LC	○
禾本科	假儉草	<i>Eremochloa ophiuroides</i> (Munro) Hack.	原生	LC	○
禾本科	高野黍	<i>Eriochloa procera</i> (Retz.) C.E. Hubb.	原生	LC	-
禾本科	扁穗牛鞭草	<i>Hemarthria compressa</i> (L. f.) R. Br.	原生	LC	-
禾本科	白茅	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) P. Beauv. var. <i>major</i> (Nees) C.E. Hubb. ex C.E. Hubb. & Vaughan	原生	LC	-
禾本科	芒穗鴨嘴草	<i>Ischaemum aristatum</i> L. var. <i>aristatum</i>	特有	LC	○
禾本科	粗毛鴨嘴草	<i>Ischaemum barbatum</i> Retzius	原生	LC	-
禾本科	印度鴨嘴草	<i>Ischaemum indicum</i> (Houtt.) Merr.	原生	LC	-
禾本科	千金子	<i>Leptochloa chinensis</i> (L.) Nees	原生	LC	-
禾本科	剛莠竹	<i>Microstegium ciliatum</i> (Trin.) A. Camus	原生	LC	○
禾本科	五節芒	<i>Miscanthus floridulus</i> (Labill.) Warb. ex K. Schum. & Lauterb.	原生	LC	-
禾本科	芒	<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson	原生	LC	-
禾本科	竹葉草	<i>Oplismenus compositus</i> (L.) P. Beauv.	原生	LC	○
禾本科	水生黍	<i>Panicum paludosum</i> Roxb.	原生	LC	-
禾本科	鋪地黍	<i>Panicum repens</i> L.	原生	LC	-
禾本科	細柄黍	<i>Panicum sumatrense</i> Roth ex Roem. & Schult.	原生	LC	○

禾本科	雙穗雀稗	<i>Paspalum distichum</i> L.	原生	LC	—
禾本科	圓果雀稗	<i>Paspalum orbiculare</i> G. Forst.	原生	LC	○
禾本科	鴨姆草	<i>Paspalum scrobiculatum</i> L.	原生	LC	—
禾本科	雀稗	<i>Paspalum thunbergii</i> Kunth	原生	LC	—
禾本科	海雀稗	<i>Paspalum vaginatum</i> Sw.	原生	LC	—
禾本科	蘆葦	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin ex Steud.	原生	LC	○
禾本科	桂竹	<i>Phyllostachys makinoi</i> Hayata	特有	LC	—
禾本科	金絲草	<i>Pogonatherum crinitum</i> (Thunb.) Kunth	原生	LC	—
禾本科	甜根子草	<i>Saccharum spontaneum</i> L.	原生	LC	—
禾本科	囊穎草	<i>Sacciolepis indica</i> (L.) Chase	原生	LC	○
禾本科	棕葉狗尾草	<i>Setaria palmifolia</i> (J. Koenig) Stapf	原生	LC	—
禾本科	濱刺草	<i>Spinifex littoreus</i> (Burm. f.) Merr.	原生	LC	—
禾本科	鼠尾粟	<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R. Br. var. <i>major</i> (Buse) Baaijens	原生	LC	○
百部科	百部	<i>Stemona tuberosa</i> Lour.	原生	LC	—
流蘇菜科	流蘇菜	<i>Ruppia maritima</i> L.	原生	LC	—
莎草科	毛球柱草	<i>Bulbostylis barbata</i> (Rottb.) C.B Clarke	原生	LC	—
莎草科	異花莎草	<i>Cyperus difformis</i> L.	原生	LC	—
莎草科	茳芏鹹草	<i>Cyperus malaccensis</i> Lam.	原生	LC	○
莎草科	斷節莎	<i>Cyperus odoratus</i> L.	原生	LC	○
莎草科	香附子	<i>Cyperus rotundus</i> L.	原生	LC	○
莎草科	粗根莖莎草	<i>Cyperus stoloniferus</i> Retz.	原生	LC	○
莎草科	黃色飄拂草	<i>Fimbristylis sericea</i> (Poir.) R. Br.	原生	LC	—
拔莢科	糙莖拔莢	<i>Smilax bracteata</i> C. Presl var. <i>verruculosa</i> (Merr.) T. Koyama	原生	LC	—
拔莢科	臺灣土茯苓	<i>Smilax lanceifolia</i> Roxb.	原生	LC	—
鴨跖草科	穿鞘花	<i>Amischotolype glabrata</i> Hassk.	原生	LC	—
鴨跖草科	鴨跖草	<i>Commelina communis</i> L.	原生	LC	—
鴨跖草科	杜若	<i>Polia japonica</i> Thunb.	原生	LC	○
薑科	月桃	<i>Alpinia zerumbet</i> (Pers.) B.L. Burtt & R.M. Sm.	原生	LC	—
薑科	多穗薑	<i>Zingiber pleiostachyum</i> K. Schum.	特有	LC	○
薯蕷科	大薯	<i>Dioscorea alata</i> L.	原生	LC	—
薯蕷科	大青薯	<i>Dioscorea benthamii</i> Prain & Burkill	原生	LC	○
露兜樹科	林投	<i>Pandanus odoratissimus</i> L. f.	原生	LC	○
石蒜科	山蒜	<i>Allium grayi</i> Regal	原生	DD	○
禾本科	細葉畫眉草	<i>Eragrostis nutans</i> (Retz.) Nees ex Steud.	原生	DD	—
天門冬科	瓊麻	<i>Agave sisalana</i> Perrine ex Engelm.	歸化	NA	—
天門冬科	虎尾蘭	<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain	栽培	NA	—
天南星科	芋	<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott var. <i>esculenta</i>	歸化	NA	—

天南星科	黛粉葉	<i>Dieffenbachia seguine</i> (Jacq.) Schott	栽培	NA	○
石蒜科	蔥	<i>Allium fistulosum</i> L.	栽培	NA	—
石蒜科	蔥蘭	<i>Zephyranthes candida</i> (Lindl.) Herb.	栽培	NA	—
禾本科	蓬萊竹	<i>Bambusa multiplex</i> (Lour.) Raeusch. ex Schult. & Schult. f.	栽培	NA	—
禾本科	綠竹	<i>Bambusa oldhamii</i> Munro	栽培	NA	○
禾本科	刺竹	<i>Bambusa spinosa</i> Roxb.	歸化	NA	—
禾本科	巴拉草	<i>Brachiaria mutica</i> (Forssk.) Stapf	入侵	NA	—
禾本科	蒺藜草	<i>Cenchrus echinatus</i> L.	歸化	NA	○
禾本科	孟仁草	<i>Chloris barbata</i> Sw.	入侵	NA	—
禾本科	長穎星草	<i>Cynodon nlemfuensis</i> Vanderyst	入侵	NA	○
禾本科	星草	<i>Cynodon plectostachyus</i> (K. Schum.) Pilg.	入侵	NA	○
禾本科	麻竹	<i>Dendrocalamus latiflorus</i> Munro	歸化	NA	—
禾本科	雙花草	<i>Dichanthium annulatum</i> (Forssk.) Stapf	歸化	NA	○
禾本科	馬唐	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	歸化	NA	—
禾本科	細穗千金子	<i>Leptochloa fusca</i> (L.) Kunth subsp. <i>uninervia</i> (J. Presl) N. Snow	歸化	NA	—
禾本科	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	栽培	NA	○
禾本科	大黍	<i>Panicum maximum</i> Jacq.	入侵	NA	○
禾本科	兩耳草	<i>Paspalum conjugatum</i> P.J. Bergius	入侵	NA	○
禾本科	牧地狼尾草	<i>Pennisetum polystachion</i> (L.) Schult.	歸化	NA	○
禾本科	象草	<i>Pennisetum purpureum</i> Schumach.	入侵	NA	○
禾本科	甘蔗	<i>Saccharum sinense</i> Roxb.	栽培	NA	○
禾本科	莠狗尾草	<i>Setaria parviflora</i> (Poir.) Kerguélen	原生	NA	—
禾本科	詹森草	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	歸化	NA	—
禾本科	鹽地鼠尾粟	<i>Sporobolus virginicus</i> (L.) Kunth	歸化	NA	—
禾本科	玉米	<i>Zea mays</i> L.	歸化	NA	○
美人蕉科	美人蕉	<i>Canna indica</i> L.	歸化	NA	—
旅人蕉科	天堂鳥蕉	<i>Strelitzia reginae</i> Banks	歸化	NA	○
棕櫚科	可可椰子	<i>Cocos nucifera</i> L.	栽培	NA	—
棕櫚科	黃椰子	<i>Dyopsis lutescens</i> (H. Wendl.) Beentje & J. Dransf.	栽培	NA	—
棕櫚科	大王椰子	<i>Roystonea regia</i> (Kunth) O.F. Cook	栽培	NA	○

備註：優先區*指優先規劃區官義渡生態公園範圍 3km 之資料。

◇ 陸域動物

類別	科	種	學名	區係	保育類	優先區*
哺乳類	海豚科	中華白海豚	<i>Sousa chinensis</i>	原生	I	—
	鼠海豚科	江豬 (寬脊露脊鼠海豚)	<i>Neophocaena phocaenoides</i>	原生	I	—
	小抹香鯨科	小抹香鯨	<i>Kogia breviceps</i>	原生	II	—
	小抹香鯨科	侏儒抹香鯨	<i>Kogia sima</i>	原生	II	○
	海豚科	瑞氏海豚	<i>Grampus griseus</i>	原生	II	—
	海豚科	印太瓶鼻海豚	<i>Tursiops aduncus</i>	原生	II	—
	海豚科	瓶鼻海豚	<i>Tursiops truncatus</i>	原生	II	—
	兔科	華南兔	<i>Lepus sinensis</i>	原生	-	○
	鹿科	臺灣梅花鹿	<i>Cervus nippon taiouanus</i>	特亞	-	○
	蝙蝠科	長趾鼠耳蝠	<i>Myotis secundus</i>	特有	-	○
	蝙蝠科	絨山蝠	<i>Nyctalus plancyi velutinus</i>	原生	-	—
	蝙蝠科	東亞家蝠	<i>Pipistrellus abramus</i>	原生	-	○
	尖鼠科	短尾鼯	<i>Anourosorex yamashinai</i>	特有	-	—
	尖鼠科	灰麝鼯	<i>Crocidura tanakae</i>	原生	-	—
	尖鼠科	家鼯	<i>Suncus murinus</i>	原生	-	○
	鼯鼠科	臺灣鼯鼠	<i>Mogera insularis</i>	特有	-	○
	松鼠科	赤腹松鼠	<i>Callosciurus erythraeus taiwanensis</i>	特亞	-	—
	倉鼠科	高山田鼠	<i>Alexandromys kikuchii</i>	特有	-	—
	鼠科	赤背條鼠	<i>Apodemus agrarius</i>	原生	-	○
	鼠科	鬼鼠	<i>Bandicota indica</i>	原生	-	—
	鼠科	巢鼠	<i>Micromys minutus</i>	原生	-	—
	鼠科	田鼯鼠	<i>Mus formosanus</i>	特有	-	○
	鼠科	刺鼠	<i>Niviventer coninga</i>	特有	-	—
	鼠科	高山白腹鼠	<i>Niviventer culturatus</i>	特有	-	—
	鼠科	小黃腹鼠	<i>Rattus losea</i>	原生	-	○
	鼠科	溝鼠	<i>Rattus norvegicus</i>	原生	-	○
鳥類	麻雀科	山麻雀	<i>Passer cinnamomeus</i>	原生	I	○
	鵲科	黑面琵鷺	<i>Platalea minor</i>	原生	I	○
	隼科	遊隼	<i>Falco peregrinus</i>	原生	II	—
	隼科	燕隼	<i>Falco subbuteo</i>	原生	II	—
	隼科	紅隼	<i>Falco tinnunculus</i>	原生	II	○
	八哥科	八哥	<i>Acridotheres cristatellus</i>	特亞	II	○
	王鵲科	紫綬帶	<i>Terpsiphone atrocaudata</i>	原生	II	—
	噪眉科	臺灣畫眉	<i>Garrulax taewanus</i>	特有	II	—

		鷓鴣科	野鷓	<i>Emberiza sulphurata</i>	原生	II	—
		雁鴨科	巴鴨	<i>Sibirionetta formosa</i>	原生	II	—
		鷗鴞科	短耳鷗	<i>Asio flammeus</i>	原生	II	○
		鷗鴞科	領角鷗	<i>Otus lettia</i>	特亞	II	—
		水雉科	水雉	<i>Hydrophasianus chirurgus</i>	原生	II	○
		彩鷸科	彩鷸	<i>Rostratula benghalensis</i>	原生	II	○
		鷗科	白眉燕鷗	<i>Onychoprion anaethetus</i>	原生	II	—
		鷗科	黑嘴鷗	<i>Saundersilarus saundersi</i>	原生	II	—
		鷗科	蒼燕鷗	<i>Sterna sumatrana</i>	原生	II	—
		鷗科	小燕鷗	<i>Sternula albifrons</i>	原生	II	○
		鷗科	鳳頭燕鷗	<i>Thalasseus bergii</i>	原生	II	○
		鷸科	白琵鷺	<i>Platalea leucorodia</i>	原生	II	—
		鵟科	魚鷹	<i>Pandion haliaetus</i>	原生	II	○
		鷹科	日本松雀鷹	<i>Accipiter gularis</i>	原生	II	—
		鷹科	北雀鷹	<i>Accipiter nisus</i>	原生	II	—
		鷹科	赤腹鷹	<i>Accipiter soloensis</i>	原生	II	—
		鷹科	鳳頭蒼鷹	<i>Accipiter trivirgatus</i>	特亞	II	—
		鷹科	松雀鷹	<i>Accipiter virgatus</i>	特亞	II	—
		鷹科	灰面鵟鷹	<i>Butastur indicus</i>	原生	II	—
		鷹科	大鵟	<i>Buteo hemilasius</i>	原生	II	—
		鷹科	東方鵟	<i>Buteo japonicus</i>	原生	II	○
		鷹科	黑翅鵟	<i>Elanus caeruleus</i>	原生	II	○
		鷹科	林鵟	<i>Ictinaetus malaiensis</i>	原生	II	—
		鷹科	黑鵟	<i>Milvus migrans</i>	原生	II	○
		鷹科	東方蜂鷹	<i>Pernis ptilorhynchus</i>	原生	II	—
		鷹科	大冠鵟	<i>Spilornis cheela</i>	特亞	II	○
		伯勞科	紅尾伯勞	<i>Lanius cristatus</i>	原生	III	○
		梅花雀科	黑頭文鳥	<i>Lonchura atricapilla</i>	原生	III	○
		燕鵐科	燕鵐	<i>Glareola maldivarum</i>	原生	III	○
		鷓鴣科	大濱鷓	<i>Calidris tenuirostris</i>	原生	III	—
		鷓鴣科	黑尾鷓	<i>Limosa limosa</i>	原生	III	○
		鷓鴣科	大杓鷓	<i>Numenius arquata</i>	原生	III	—
		翠鳥科	翠鳥	<i>Alcedo atthis</i>	原生	—	○
		戴勝科	戴勝	<i>Upupa epops</i>	原生	—	—
		夜鷹科	南亞夜鷹	<i>Caprimulgus affinis</i>	特亞	—	—
		雨燕科	小雨燕	<i>Apus nipalensis</i>	特亞	—	○
		八哥科	白尾八哥	<i>Acridotheres javanicus</i>	原生	—	○

		八哥科	家八哥	<i>Acridotheres tristis</i>	原生	-	-
		八哥科	小椋鳥	<i>Agropsar philippensis</i>	原生	-	-
		八哥科	亞洲輝椋鳥	<i>Aplonis panayensis</i>	原生	-	-
		八哥科	黑領椋鳥	<i>Gracupica nigricollis</i>	原生	-	○
		八哥科	灰椋鳥	<i>Spodiopsar cineraceus</i>	原生	-	○
		八哥科	絲光椋鳥	<i>Spodiopsar sericeus</i>	原生	-	○
		八哥科	灰頭椋鳥	<i>Sturnia malabarica</i>	原生	-	-
		八哥科	灰背椋鳥	<i>Sturnia sinensis</i>	原生	-	○
		八哥科	歐洲椋鳥	<i>Sturnus vulgaris</i>	原生	-	○
		王鵲科	黑枕藍鵲	<i>Hypothymis azurea</i>	特亞	-	○
		王鵲科	阿穆爾綬帶	<i>Terpsiphone incei</i>	原生	-	-
		百靈科	歐亞雲雀	<i>Alauda arvensis</i>	原生	-	-
		百靈科	小雲雀	<i>Alauda gulgula</i>	原生	-	○
		伯勞科	紅頭伯勞	<i>Lanius bucephalus</i>	原生	-	○
		伯勞科	棕背伯勞	<i>Lanius schach</i>	原生	-	○
		卷尾科	大卷尾	<i>Dicrurus macrocercus</i>	特亞	-	○
		河鳥科	河鳥	<i>Cinclus pallasii</i>	原生	-	-
		柳鶯科	極北柳鶯	<i>Phylloscopus borealis</i>	原生	-	○
		柳鶯科	庫頁島柳鶯	<i>Phylloscopus borealoides</i>	原生	-	-
		柳鶯科	冠羽柳鶯	<i>Phylloscopus coronatus</i>	原生	-	-
		柳鶯科	勘察加柳鶯	<i>Phylloscopus examinandus</i>	原生	-	-
		柳鶯科	褐色柳鶯	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	原生	-	-
		柳鶯科	黃眉柳鶯	<i>Phylloscopus inornatus</i>	原生	-	-
		柳鶯科	黃腰柳鶯	<i>Phylloscopus proregulus</i>	原生	-	-
		柳鶯科	淡腳柳鶯	<i>Phylloscopus tenellipes</i>	原生	-	-
		柳鶯科	日本柳鶯	<i>Phylloscopus xanthodryas</i>	原生	-	-
		扇尾鶯科	黃頭扇尾鶯	<i>Cisticola exilis</i>	特亞	-	-
		扇尾鶯科	棕扇尾鶯	<i>Cisticola juncidis</i>	原生	-	○
		扇尾鶯科	灰頭鷓鴣	<i>Prinia flaviventris</i>	原生	-	○
		扇尾鶯科	褐頭鷓鴣	<i>Prinia inornata</i>	特亞	-	○
		扇尾鶯科	斑紋鷓鴣	<i>Prinia striata</i>	特亞	-	○
		梅花雀科	斑文鳥	<i>Lonchura punctulata</i>	原生	-	○
		梅花雀科	白腰文鳥	<i>Lonchura striata</i>	原生	-	-
		雀科	金翅雀	<i>Chloris sinica</i>	原生	-	-
		雀科	花雀	<i>Fringilla montifringilla</i>	原生	-	-
		麻雀科	麻雀	<i>Passer montanus</i>	原生	-	○
		畫眉科	山紅頭	<i>Cyanoderma ruficeps</i>	特亞	-	○

		畫眉科	小彎嘴	<i>Pomatorhinus musicus</i>	特有	-	○
		葦鶯科	東方大葦鶯	<i>Acrocephalus orientalis</i>	原生	-	○
		鴉科	巨嘴鴉	<i>Corvus macrorhynchos</i>	原生	-	-
		鴉科	樹鵲	<i>Dendrocitta formosae</i>	特亞	-	○
		鴉科	喜鵲	<i>Pica serica</i>	原生	-	○
		噪眉科	繡眼畫眉	<i>Alcippe morrisonia</i>	特有	-	-
		樹鶯科	遠東樹鶯	<i>Horornis canturians</i>	原生	-	○
		樹鶯科	日本樹鶯	<i>Horornis diphone</i>	原生	-	-
		燕科	東方金腰燕 (daurica 群)(金腰燕)	<i>Cecropis daurica</i> [daurica Group]	原生	-	-
		燕科	家燕	<i>Hirundo rustica</i>	原生	-	○
		燕科	洋燕	<i>Hirundo tahitica</i>	原生	-	○
		燕科	棕沙燕	<i>Riparia chinensis</i>	原生	-	○
		織布文鳥科	黑頭織雀	<i>Ploceus cucullatus</i>	外來	-	-
		繡眼科	斯氏繡眼	<i>Zosterops simplex</i>	原生	-	○
		鶉科	黃眉鶉	<i>Emberiza chrysophrys</i>	原生	-	-
		鶉科	黃喉鶉	<i>Emberiza elegans</i>	原生	-	-
		鶉科	赤胸鶉	<i>Emberiza fucata</i>	原生	-	-
		鶉科	黃喉黑臉鶉	<i>Emberiza personata</i>	原生	-	○
		鶉科	小鶉	<i>Emberiza pusilla</i>	原生	-	-
		鶉科	灰頭黑臉鶉	<i>Emberiza spodocephala</i>	原生	-	○
		鶉科	白眉鶉	<i>Emberiza tristrami</i>	原生	-	-
		鵲科	棕耳鵲	<i>Hypsipetes amaurotis</i>	特亞	-	○
		鵲科	紅嘴黑鵲	<i>Hypsipetes leucocephalus</i>	特亞	-	○
		鵲科	白頭翁	<i>Pycnonotus sinensis</i>	特亞	-	○
		鵲科	烏灰鵲	<i>Turdus cardis</i>	原生	-	-
		鵲科	赤腹鵲	<i>Turdus chrysolaus</i>	原生	-	○
		鵲科	斑點鵲	<i>Turdus eunomus</i>	原生	-	○
		鵲科	中國黑鵲	<i>Turdus mandarinus</i>	原生	-	-
		鵲科	紅尾鵲	<i>Turdus naumanni</i>	原生	-	-
		鵲科	白眉鵲	<i>Turdus obscurus</i>	原生	-	-
		鵲科	白腹鵲	<i>Turdus pallidus</i>	原生	-	○
		鵲科	白氏地鵲	<i>Zoothera aurea</i>	原生	-	-
		鵲科	虎斑地鵲	<i>Zoothera dauma</i>	原生	-	-
		鶯科	粉紅鸚嘴	<i>Sinosuthora webbiana</i>	特亞	-	○
		鵲科	野鵲	<i>Calliope calliope</i>	原生	-	○
		鵲科	白腰鵲鵲	<i>Copsychus malabaricus</i>	原生	-	-

	鵲科	鵲鴿	<i>Copsychus saularis</i>	原生	-	○
	鵲科	白腹琉璃	<i>Cyanoptila cyanomelana</i>	原生	-	-
	鵲科	黃眉黃鵲	<i>Ficedula narcissina</i>	原生	-	-
	鵲科	藍磯鶇	<i>Monticola solitarius</i>	原生	-	○
	鵲科	寬嘴鵲	<i>Muscicapa dauurica</i>	原生	-	-
	鵲科	灰斑鵲	<i>Muscicapa griseisticta</i>	原生	-	-
	鵲科	黃尾鵲	<i>Phoenicurus aureus</i>	原生	-	○
	鵲科	黑喉鵲	<i>Saxicola stejnegeri</i>	原生	-	-
	鵲科	藍尾鵲	<i>Tarsiger cyanurus</i>	原生	-	-
	鵲鴿科	赤喉鵲	<i>Anthus cervinus</i>	原生	-	○
	鵲鴿科	白背鵲	<i>Anthus gustavi</i>	原生	-	-
	鵲鴿科	樹鵲	<i>Anthus hodgsoni</i>	原生	-	○
	鵲鴿科	大花鵲	<i>Anthus richardi</i>	原生	-	-
	鵲鴿科	黃腹鵲	<i>Anthus rubescens</i>	原生	-	-
	鵲鴿科	白鵲鴿	<i>Motacilla alba</i>	原生	-	○
	鵲鴿科	灰鵲鴿	<i>Motacilla cinerea</i>	原生	-	○
	鵲鴿科	黃頭鵲鴿	<i>Motacilla citreola</i>	原生	-	-
	鵲鴿科	東方黃鵲鴿	<i>Motacilla tschutschensis</i>	原生	-	○
	雁鴨科	尖尾鴨	<i>Anas acuta</i>	原生	-	○
	雁鴨科	小水鴨	<i>Anas crecca</i>	原生	-	○
	雁鴨科	綠頭鴨	<i>Anas platyrhynchos</i>	原生	-	○
	雁鴨科	花嘴鴨	<i>Anas zonorhyncha</i>	原生	-	○
	雁鴨科	紅頭潛鴨	<i>Aythya ferina</i>	原生	-	-
	雁鴨科	鳳頭潛鴨	<i>Aythya fuligula</i>	原生	-	-
	雁鴨科	斑背潛鴨	<i>Aythya marila</i>	原生	-	-
	雁鴨科	疣鼻棲鴨	<i>Cairina moschata</i>	外來	-	-
	雁鴨科	羅文鴨	<i>Mareca falcata</i>	原生	-	-
	雁鴨科	赤頸鴨	<i>Mareca penelope</i>	原生	-	○
	雁鴨科	琵嘴鴨	<i>Spatula clypeata</i>	原生	-	○
	雁鴨科	白眉鴨	<i>Spatula querquedula</i>	原生	-	-
	雁鴨科	花鳧	<i>Tadorna tadorna</i>	原生	-	-
	三趾鶉科	棕三趾鶉	<i>Turnix suscitator</i>	特亞	-	-
	長腳鶉科	高蹺鶉	<i>Himantopus himantopus</i>	原生	-	○
	長腳鶉科	反嘴鶉	<i>Recurvirostra avosetta</i>	原生	-	-
	海雀科	扁嘴海雀	<i>Synthliboramphus antiquus</i>	原生	-	-
	賊鷗科	長尾賊鷗	<i>Stercorarius longicaudus</i>	原生	-	-
	賊鷗科	短尾賊鷗	<i>Stercorarius parasiticus</i>	原生	-	-

		賊鷗科	中賊鷗	<i>Stercorarius pomarinus</i>	原生	-	-
		鴿科	東方環頸鴿	<i>Charadrius alexandrinus</i>	原生	-	○
		鴿科	小環頸鴿	<i>Charadrius dubius</i>	原生	-	○
		鴿科	鐵嘴鴿	<i>Charadrius leschenaultii</i>	原生	-	-
		鴿科	蒙古鴿	<i>Charadrius mongolus</i>	原生	-	-
		鴿科	劍鴿	<i>Charadrius placidus</i>	原生	-	-
		鴿科	太平洋金斑鴿	<i>Pluvialis fulva</i>	原生	-	○
		鴿科	灰斑鴿	<i>Pluvialis squatarola</i>	原生	-	○
		鴿科	跳鴿	<i>Vanellus cinereus</i>	原生	-	-
		鴿科	小瓣鴿	<i>Vanellus vanellus</i>	原生	-	-
		鷗科	黑腹燕鷗	<i>Chlidonias hybrida</i>	原生	-	-
		鷗科	白翅黑燕鷗	<i>Chlidonias leucopterus</i>	原生	-	-
		鷗科	紅嘴鷗	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	原生	-	-
		鷗科	白腰燕鷗	<i>Onychoprion aleuticus</i>	原生	-	-
		鷗科	燕鷗	<i>Sterna hirundo</i>	原生	-	-
		鷗科	磯鷗	<i>Actitis hypoleucos</i>	原生	-	○
		鷗科	翻石鷗	<i>Arenaria interpres</i>	原生	-	-
		鷗科	尖尾濱鷗	<i>Calidris acuminata</i>	原生	-	○
		鷗科	三趾濱鷗	<i>Calidris alba</i>	原生	-	-
		鷗科	黑腹濱鷗	<i>Calidris alpina</i>	原生	-	○
		鷗科	彎嘴濱鷗	<i>Calidris ferruginea</i>	原生	-	○
		鷗科	流蘇鷗	<i>Calidris pugnax</i>	原生	-	-
		鷗科	紅胸濱鷗	<i>Calidris ruficollis</i>	原生	-	-
		鷗科	長趾濱鷗	<i>Calidris subminuta</i>	原生	-	-
		鷗科	丹氏濱鷗	<i>Calidris temminckii</i>	原生	-	-
		鷗科	田鷗	<i>Gallinago gallinago</i>	原生	-	-
		鷗科	中地鷗	<i>Gallinago megala</i>	原生	-	-
		鷗科	針尾鷗	<i>Gallinago stenura</i>	原生	-	-
		鷗科	小杓鷗	<i>Numenius minutus</i>	原生	-	○
		鷗科	中杓鷗	<i>Numenius phaeopus</i>	原生	-	-
		鷗科	紅領瓣足鷗	<i>Phalaropus lobatus</i>	原生	-	-
		鷗科	黃足鷗	<i>Tringa brevipes</i>	原生	-	-
		鷗科	鶴鷗	<i>Tringa erythropus</i>	原生	-	-
		鷗科	鷹斑鷗	<i>Tringa glareola</i>	原生	-	○
		鷗科	青足鷗	<i>Tringa nebularia</i>	原生	-	○
		鷗科	白腰草鷗	<i>Tringa ochropus</i>	原生	-	○
		鷗科	小青足鷗	<i>Tringa stagnatilis</i>	原生	-	-

		鶇科	赤足鶇	<i>Tringa totanus</i>	原生	-	○
		鶇科	反嘴鶇	<i>Xenus cinereus</i>	原生	-	-
		啄木鳥科	小啄木	<i>Yungipicus canicapillus</i>	原生	-	-
		鬚鴛科	五色鳥	<i>Psilopogon nuchalis</i>	特有	-	-
		鳩鴿科	野鴿	<i>Columba livia</i>	原生	-	○
		鳩鴿科	灰林鴿	<i>Columba pulchricollis</i>	原生	-	-
		鳩鴿科	珠頸斑鳩	<i>Spilopelia chinensis</i>	原生	-	-
		鳩鴿科	金背鳩	<i>Streptopelia orientalis</i>	特亞	-	○
		鳩鴿科	紅鳩	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	原生	-	○
		雉科	臺灣竹雞	<i>Bambusicola sonorivox</i>	特有	-	-
		杜鵑科	番鵲	<i>Centropus bengalensis</i>	原生	-	-
		杜鵑科	噪鵲	<i>Eudynamys scolopaceus</i>	原生	-	-
		鵲科	埃及聖鵲	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	原生	-	○
		鷺科	大白鷺	<i>Ardea alba</i>	原生	-	○
		鷺科	蒼鷺	<i>Ardea cinerea</i>	原生	-	○
		鷺科	中白鷺	<i>Ardea intermedia</i>	原生	-	○
		鷺科	池鷺	<i>Ardeola bacchus</i>	原生	-	○
		鷺科	黃頭鷺	<i>Bubulcus ibis</i>	原生	-	○
		鷺科	小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>	原生	-	○
		鷺科	黑冠麻鷺	<i>Gorsachius melanolophus</i>	原生	-	○
		鷺科	黃小鷺	<i>Ixobrychus sinensis</i>	原生	-	○
		鷺科	夜鷺	<i>Nycticorax nycticorax</i>	原生	-	○
		秧雞科	白腹秧雞	<i>Amaurornis phoenicurus</i>	原生	-	○
		秧雞科	白冠雞	<i>Fulica atra</i>	原生	-	○
		秧雞科	紅冠水雞	<i>Gallinula chloropus</i>	原生	-	○
		秧雞科	灰胸秧雞	<i>Lewinia striata</i>	特亞	-	-
		秧雞科	緋秧雞	<i>Zapornia fusca</i>	原生	-	○
		鸕鶿科	小鸕鶿	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	原生	-	○
		軍艦鳥科	白斑軍艦鳥	<i>Fregata ariel</i>	原生	-	-
		鸕鷀科	鸕鷀	<i>Phalacrocorax carbo</i>	原生	-	○
		鶻科	大水獺鳥	<i>Calonectris leucomelas</i>	原生	-	-
	爬行類	黃頰蛇科	黑眉錦蛇	<i>Elaphe taeniura</i>	原生	III	-
		黃頰蛇科	草花蛇	<i>Fowlea flavipunctatus</i>	原生	III	-
		水蛇科	韋氏水蛇	<i>Hypsiscopus wettsteini</i>	原生	-	○
		正蜥科	臺灣草蜥	<i>Takydromus formosanus</i>	特有	-	-
		正蜥科	蓬萊草蜥	<i>Takydromus stejnegeri</i>	特有	-	-
		石龍子科	中國石龍子	<i>Plestiodon chinensis</i>	原生	-	○

		石龍子科	麗紋石龍子	<i>Plestiodon elegans</i>	原生	-	○
		盲蛇科	鉤盲蛇	<i>Indotyphlops braminus</i>	原生	-	○
		飛蜥科	斯文豪氏攀蜥	<i>Diploderma swinhonis</i>	特有	-	-
		黃頷蛇科	王錦蛇	<i>Elaphe carinata</i>	原生	-	○
		黃頷蛇科	紅斑蛇	<i>Lycodon rufozonatus rufozonatus</i>	原生	-	○
		黃頷蛇科	赤背松柏根	<i>Oligodon formosanus</i>	原生	-	-
		黃頷蛇科	南蛇	<i>Ptyas mucosa</i>	原生	-	-
		蝮蛇科	眼鏡蛇	<i>Naja atra</i>	原生	-	-
		壁虎科	無疣蜥虎	<i>Hemidactylus bowringii</i>	原生	-	-
		壁虎科	疣尾蜥虎	<i>Hemidactylus frenatus</i>	外來	-	○
		地龜科	斑龜	<i>Mauremys sinensis</i>	原生	-	-
		澤龜科	紅耳泥龜	<i>Trachemys scripta elegans</i>	外來	-	-
		鱉科	中華鱉	<i>Pelodiscus sinensis</i>	原生	-	-
	兩生類	叉舌蛙科	澤蛙	<i>Fejervarya limnocharis</i>	原生	-	○
		叉舌蛙科	虎皮蛙	<i>Hoplobatrachus chinensis</i>	原生	-	-
		赤蛙科	貢德氏赤蛙	<i>Hylarana guentheri</i>	原生	-	-
		赤蛙科	拉都希氏赤蛙	<i>Hylarana latouchii</i>	原生	-	○
		赤蛙科	長腳赤蛙	<i>Rana longicrus</i>	特有	-	-
		狹口蛙科	亞洲錦蛙	<i>Kaloula pulchra pulchra</i>	外來	-	-
		狹口蛙科	小雨蛙	<i>Microhyla fissipes</i>	原生	-	-
		樹蛙科	斑腿樹蛙	<i>Polypedates megacephalus</i>	外來	-	-
		樹蟾科	中國樹蟾	<i>Hyla chinensis</i>	原生	-	-
		蟾蜍科	黑眶蟾蜍	<i>Duttaphrynus melanostictus</i>	原生	-	○
	蝶類	灰蝶科	靛色琉灰蝶	<i>Acytolepis puspa myla</i>	原生	-	-
		灰蝶科	細邊琉灰蝶	<i>Celastrina lavendularis himilcon</i>	原生	-	-
		灰蝶科	玳灰蝶	<i>Deudorix epijarbas menesicles</i>	原生	-	-
		灰蝶科	雅波灰蝶	<i>Jamides bochus formosanus</i>	原生	-	-
		灰蝶科	豆波灰蝶	<i>Lampides boeticus</i>	原生	-	-
		灰蝶科	黑星灰蝶	<i>Megisba malaya sikkima</i>	原生	-	-
		灰蝶科	波灰蝶	<i>Prosotas nora formosana</i>	原生	-	-
		灰蝶科	虎灰蝶	<i>Spindasis lohita formosanus</i>	特亞	-	-
		灰蝶科	藍灰蝶	<i>Zizeeria maha maha</i>	原生	-	-
		弄蝶科	尖翅褐弄蝶	<i>Pelopidas agna</i>	原生	-	-
		弄蝶科	巨褐弄蝶	<i>Pelopidas conjuncta</i>	原生	-	-
		弄蝶科	墨子黃斑弄蝶	<i>Potanthus motzui</i>	特有	-	-
		粉蝶科	遷粉蝶	<i>Catopsilia pomona pomona</i>	原生	-	-
		粉蝶科	細波遷粉蝶	<i>Catopsilia pyranthe pyranthe</i>	原生	-	-

	粉蝶科	亮色黃蝶	<i>Eurema blanda arsakia</i>	原生	-	-
	粉蝶科	黃蝶	<i>Eurema hecabe</i>	原生	-	-
	粉蝶科	白粉蝶	<i>Pieris rapae crucivora</i>	外來	-	-
	蛺蝶科	網絲蛺蝶	<i>Cyrestis thyodamas formosana</i>	原生	-	-
	蛺蝶科	金斑蝶	<i>Danaus chrysippus</i>	原生	-	-
	蛺蝶科	異紋紫斑蝶	<i>Euploea mulciber barsine</i>	原生	-	-
	蛺蝶科	雙標紫斑蝶 (斯氏紫斑蝶)	<i>Euploea sylvester swinhoei</i>	原生	-	○
	蛺蝶科	紅斑脈蛺蝶	<i>Hestina assimilis formosana</i>	原生	-	-
	蛺蝶科	幻蛺蝶	<i>Hypolimnas bolina kezia</i>	原生	-	-
	蛺蝶科	雌擬幻蛺蝶	<i>Hypolimnas misippus</i>	原生	-	-
	蛺蝶科	旖斑蝶	<i>Ideopsis similis</i>	原生	-	-
	蛺蝶科	眼蛺蝶	<i>Junonia almana</i>	原生	-	-
	蛺蝶科	豆環蛺蝶	<i>Neptis hylas luculenta</i>	原生	-	-
	蛺蝶科	細帶環蛺蝶	<i>Neptis nata lutatia</i>	原生	-	-
	蛺蝶科	斯氏絹斑蝶	<i>Parantica swinhoei</i>	原生	-	-
	蛺蝶科	小波眼蝶	<i>Ypthima baldus zodina</i>	原生	-	-
	鳳蝶科	大鳳蝶	<i>Papilio agenor heronus</i>	原生	-	-
	鳳蝶科	花鳳蝶	<i>Papilio demoleus</i>	原生	-	-

備註：優先區*指優先規劃區官義渡生態公園範圍 3km 之資料。

◇ 水域動物

類別	科	種	學名	區係	保育類	優先區*
魚類	鰺科	花身鰺	<i>Terapon jarbua</i>	原生	-	○
	鰺科	條紋鰺	<i>Terapon theraps</i>	原生	-	-
	海鯧科	大眼海鯧	<i>Elops machnata</i>	原生	-	○
	慈鯛科	吉利慈鯛	<i>Coptodon zillii</i>	外來	-	-
	慈鯛科	莫三比克口孵非鯽	<i>Oreochromis mossambicus</i>	外來	-	-
	虱目魚科	虱目魚	<i>Chanos chanos</i>	原生	-	○
	二齒魨科	六斑二齒魨	<i>Diodon holocanthus</i>	原生	-	-
	鰻科	前鱗龜鰻	<i>Chelon affinis</i>	原生	-	○
	鰻科	長鰭莫鰻	<i>Moolgarda cunnesius</i>	原生	-	-
	鰻科	鰻	<i>Mugil cephalus</i>	原生	-	○
	鰻科	大鱗鰻	<i>Planiliza macrolepis</i>	原生	-	○
	鰻科	綠背鰻	<i>Planiliza subviridis</i>	原生	-	○
	龍占魚科	青嘴龍占魚	<i>Lethrinus nebulosus</i>	原生	-	-
	鯛科	琉球棘鯛	<i>Acanthopagrus chinshira</i>	原生	-	-

		鯛科	黃鰭棘鯛	<i>Acanthopagrus latus</i>	原生	-	○
		鯛科	太平洋棘鯛	<i>Acanthopagrus pacificus</i>	原生	-	-
		鯛科	黑棘鯛	<i>Acanthopagrus schlegelii</i>	原生	-	-
		鯛科	臺灣棘鯛	<i>Acanthopagrus taiwanensis</i>	特有	-	-
		鯛科	平鯛	<i>Rhabdosargus sarba</i>	原生	-	-
		鯷科	環球海鯷	<i>Nematalosa come</i>	原生	-	○
		海鯰科	斑海鯰	<i>Arius maculatus</i>	原生	-	○
		鱸科	短臀瘋鱸	<i>Tachysurus brevianalis</i>	特有	-	-
		牙鯨科	牙鯨	<i>Paralichthys olivaceus</i>	原生	-	-
		塘鱧科	褐塘鱧	<i>Eleotris fusca</i>	原生	-	○
		鰕虎科	青斑細棘鰕虎	<i>Acentrogobius viridipunctatus</i>	原生	-	○
		鰕虎科	黑頭阿胡鰕虎	<i>Awaous melanocephalus</i>	原生	-	-
		鰕虎科	彈塗魚	<i>Periophthalmus modestus</i>	原生	-	○
		鰕虎科	極樂吻鰕虎	<i>Rhinogobius similis</i>	原生	-	-
		鰕虎科	裸頸縞鰕虎	<i>Tridentiger nudicervicus</i>	原生	-	-
		鯻科	馬拉巴若鯻	<i>Carangoides malabaricus</i>	原生	-	○
		鯻科	浪人鯻	<i>Caranx ignobilis</i>	原生	-	○
		鯻科	六帶鯻	<i>Caranx sexfasciatus</i>	原生	-	○
		鯻科	大口逆鈎鯻	<i>Scomberoides commersonnianus</i>	原生	-	○
		鰻鱺科	日本鰻鱺	<i>Anguilla japonica</i>	原生	-	○
		鰻鱺科	花鰻鱺	<i>Anguilla marmorata</i>	原生	-	○
		鑽嘴魚科	曳絲鑽嘴魚	<i>Gerres filamentosus</i>	原生	-	○
		鑽嘴魚科	大棘鑽嘴魚	<i>Gerres macracanthus</i>	原生	-	○
		石首魚科	鮫	<i>Miichthys miiuy</i>	原生	-	-
		石鱸科	三線磯鱸	<i>Parapristipoma trilineatum</i>	原生	-	-
		石鱸科	花尾胡椒鯛	<i>Plectorhinchus cinctus</i>	原生	-	-
		石鱸科	星雞魚	<i>Pomadasys kaakan</i>	原生	-	○
		尖吻鱸科	尖吻鱸	<i>Lates calcarifer</i>	原生	-	-
		沙鯪科	日本沙鯪	<i>Sillago japonica</i>	原生	-	○
		沙鯪科	多鱗沙鯪	<i>Sillago sihama</i>	原生	-	○
		臭肚魚科	褐臭肚魚	<i>Siganus fuscescens</i>	原生	-	-
		笛鯛科	銀紋笛鯛	<i>Lutjanus argentimaculatus</i>	原生	-	-
		笛鯛科	單斑笛鯛	<i>Lutjanus monostigma</i>	原生	-	-
		鮨科	點帶石斑魚	<i>Epinephelus coioides</i>	原生	-	-
		鰻科	短棘鰻	<i>Leiognathus equulus</i>	原生	-	○
		鰻科	項斑項鰻	<i>Nuchequula nuchalis</i>	原生	-	○
	蝦蟹類	大眼蟹科	萬歲大眼蟹	<i>Macrophthalmus banzai</i>	原生	-	○

		弓蟹科	日本絨螯蟹	<i>Eriocheir japonica</i>	原生	-	-
		弓蟹科	臺灣厚蟹	<i>Helice formosensis</i>	原生	-	○
		弓蟹科	秀麗長方蟹	<i>Metaplex elegans</i>	原生	-	○
		弓蟹科	字紋弓蟹	<i>Varuna litterata</i>	原生	-	○
		方蟹科	白紋方蟹	<i>Grapsus albolineatus</i>	原生	-	-
		方蟹科	絨毛近方蟹	<i>Hemigrapsus penicillatus</i>	原生	-	○
		毛帶蟹科	雙扇股窗蟹	<i>Scopimera bitympana</i>	原生	-	○
		毛帶蟹科	長趾股窗蟹	<i>Scopimera longidactyla</i>	原生	-	-
		沙蟹科	乳白南方招潮	<i>Austruca lactea</i>	原生	-	○
		沙蟹科	北方丑招潮蟹	<i>Gelasimus borealis</i>	原生	-	○
		沙蟹科	角眼沙蟹	<i>Ocypode ceratophthalmus</i>	原生	-	-
		沙蟹科	斯氏沙蟹	<i>Ocypode stimpsoni</i>	原生	-	-
		沙蟹科	弧邊管招潮蟹	<i>Tubuca arcuata</i>	原生	-	○
		沙蟹科	屠氏管招潮蟹	<i>Tubuca dussumieri</i>	原生	-	-
		和尚蟹科	短指和尚蟹	<i>Mictyris brevidactylus</i>	原生	-	○
		長臂蝦科	臺灣沼蝦	<i>Macrobrachium formosense</i>	原生	-	○
		長臂蝦科	日本沼蝦	<i>Macrobrachium nipponense</i>	原生	-	-
		相手蟹科	紅螯螳臂蟹	<i>Chiromantes haematocheir</i>	原生	-	-
		相手蟹科	雙齒近相手蟹	<i>Parasesarma bidens</i>	原生	-	○
		相手蟹科	斑點擬相手蟹	<i>Parasesarma pictum</i>	原生	-	○
		陸寄居蟹科	皺紋陸寄居蟹	<i>Coenobita rugosus</i>	原生	-	-
		對蝦科	刀額新對蝦	<i>Metapenaeus ensis</i>	原生	-	○
		黎明蟹科	頑強黎明蟹	<i>Matuta victor</i>	原生	-	-
	螺貝類	小海蜷科	燒酒海蜷	<i>Batillaria zonalis</i>	原生	-	○
		玉黍螺科	翻唇玉黍螺	<i>Littoraria ardouiniana</i>	原生	-	○
		玉黍螺科	波紋玉黍螺	<i>Littoraria undulata</i>	原生	-	○
		錐蜷科	瘤蜷	<i>Tarebia granifera</i>	原生	-	-
		蘋果螺科	福壽螺	<i>Pomacea canaliculata</i>	外來	-	○
		蜑螺科	漁舟蜑螺	<i>Nerita albicilla</i>	原生	-	-
		蝾螺科	瘤珠螺	<i>Lunella granulata</i>	原生	-	-
		淡水笠螺科	芝麻淡水笠螺	<i>Laevapex nipponica</i>	原生	-	○
		椎實螺科	臺灣椎實螺	<i>Radix swinhoei</i>	原生	-	○
		殼菜蛤科	似雲雀殼菜蛤	<i>Hormomya mutabilis</i>	原生	-	-
		殼菜蛤科	綠殼菜蛤	<i>Perna viridis</i>	外來	-	-
		芋螺科	花瓶芋螺	<i>Conus oishii</i>	原生	-	-
		骨螺科	黑千手螺	<i>Chicoreus brunneus</i>	原生	-	-
		骨螺科	華南骨螺	<i>Murex aduncospinosus</i>	原生	-	-

	骨螺科	蚵岩螺	<i>Reishia clavigera</i>	原生	-	-
	筆螺科	錦鯉筆螺	<i>Mitra mitra</i>	原生	-	-
	織紋螺科	粗紋織紋螺	<i>Reticunassa festiva</i>	原生	-	-
	曇蛤科	中華曇蛤	<i>Glaucanome chinensis</i>	原生	-	○
	簾蛤科	文蛤	<i>Meretrix taiwanica</i>	原生	-	-
	鐘螺科	圓草蓆鐘螺	<i>Monodonta labio confusa</i>	原生	-	-
	牡蠣科	葡萄牙牡蠣	<i>Crassostrea angulata</i>	原生	-	-
	牡蠣科	棘牡蠣	<i>Crassostrea echinata</i>	原生	-	-
	銀蛤科	銀蛤	<i>Anomia chinensis</i>	原生	-	-
	障泥蛤科	馬鞍障泥蛤	<i>Isognomon ehippium</i>	原生	-	-
蜻蜓類	春蜓科	粗鉤春蜓	<i>Ictinogomphus rapax</i>	原生	-	-
	晏蜓科	綠胸晏蜓	<i>Anax parthenope</i>	原生	-	-
	細蟪科	紅腹細蟪	<i>Ceriagrion auranticum</i>	原生	-	-
	蜻蛉科	褐斑蜻蛉	<i>Brachythemis contaminata</i>	原生	-	-
	蜻蛉科	霜白蜻蛉	<i>Orthetrum pruinsum</i>	原生	-	-

備註：優先區*指優先規劃區官義渡生態公園範圍 3km 之資料。

4. 工程影響範圍潛在關注物種與棲地：

【填寫說明】依據生態資料蒐集及工程影響範圍的棲地類型，評估對棲地依賴性較高的物種，並將其列為潛在關注物種與棲地；現場勘查時針對潛在關注物種喜好的棲地，進行詳細的觀測並紀錄。

潛在關注物種/棲地	物種棲地類型及行為習性 /棲地特性	重要性或關注 原因說明
【關注棲地】 河口溼地	河口濕地是河流與海洋交界處的濕地，具有豐富的生態和多樣的生態功能。	可供許多動植物棲息環境，並在調節水文、淨化水質和保護海岸線方面發揮重要作用。
【關注物種】 雙標紫斑蝶 (斯氏紫斑蝶)	本種為特有亞種，產於全島平地至低、中海拔山區。成蟲喜歡於常綠闊葉林和海岸林等處活動，飛行緩慢，成蟲除了訪花吸蜜外，也喜歡吸植物的汁液。在冬天會群體遷徙至臺灣南部及東南部，在避風的山谷作集體越冬的現象。臺灣產紫斑蝶中，唯一雄蝶前翅背面具兩道灰色長條狀性標的種類。目前已知寄主植物僅為羊角藤(武靴藤)。	官義渡生態公園為雙標(斯氏)紫斑蝶遷徙中繼站。
【關注類別】 猛禽類	在生態系統中扮演著掠食者的角色，對維持食物鏈平衡有著重要作用。	多屬 I 或 II 保育類，官義渡生態公園具陸域及水域複合棲地，可供多樣猛禽利用。
【關注類別】 冬候鳥	冬候鳥是指在秋季從北方遷徙到南方，在冬季於較溫暖地區度過，隔年春天再返回北方繁殖的鳥類。臺灣常見的冬候鳥包括黑面琵鷺、反嘴鵠、高蹺鵠等，主要棲息在沿海濕地、魚塭、沼澤等地區。	官義渡生態公園河口為濕地環境，可為冬候鳥利用。
【關注類別】 河口濕地蟹類	河口濕地蟹類在生態系統中扮演著重要角色，例如招潮蟹的擬糞有助於分解有機質，角眼沙蟹則有助於控制其他蟹類數量，維持生態平衡。種類繁多，各自具有不同的棲息環境、食性、和獨特	官義渡生態公園河口為濕地環境，可為濕地蟹類利用。

行為。	
-----	--

填表說明：

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員填寫，工程主辦機關或設計單位協助提供所需資訊，表單請於現場勘查前填寫完成並提供工程主辦機關。
2. 本表請延續前階段生態檢核作業內容，倘若工程範圍與前階段有差異，請視範圍差異情形補充蒐集或更新生態資料。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。